Engrais pour pulvérisation foliaire
NFU 42003-2

DRF 800

Utilisable en agriculture biologique conformément au règlement européen 834/2007

Utilisable en Agriculture Biologique

Fertilisation azotée

avec extrait d'algues *Ascophyllum Nodosum*

8.0.0

- Améliore le rendement et la qualité de la récolte
- Entretien le rendement photosynthétique
- Favorise la concentration des vignes

Votre Fertilisation

DUROURE.7
61 Avenue Paul Langevin
07400 LE TEIL
Tél. : 04 75 49 17 19

www.duroure.fr

DUROURE.12
202 Allée Henri Julia
12850 SAINTE RADEGONDE
Tél. : 05 65 42 56 24

Engrais pour pulvérisation foliaire 8.0.0

NFU 42-003-01

DRF 800 est un complément de la fertilisation au sol permettant d'optimiser l'alimentation de votre culture en vu de répondre à des objectifs de rendement et de qualité.

La formulation de la gamme DRF intègre des extraits d'algues pour une homogénéité optimale, une **meilleure mouillabilité** garantissant une **meilleure absorption** ainsi qu'une plus **forte résistance au lessivage** du feuillage.

L'azote 100% végétale garantie l'absence de résidu nuisible (antibiotique, ETM, salinité moindre) pour la plante et son environnement . Sous forme directement assimilable, l'azote aura une action immédiate.

COMPOSITION

Engrais organique azoté et fer pour pulvérisation foliaire

8% d'azote N total (6,7% P/P) dont
8% (6,7% p/p) d'azpte organique végétale (peptides ,acides aminés)

La pulvérisation d'azote augmentera significativement les fractions aminées de l'azote assimilable du moût et permettra d'améliorer nettement, lors de la phase fermentaire, la **production de thiols aromatiques**.

Azote aminé + enzyme (levure) → Thiols aromatiques

Facteurs déterminant au vignoble pour la production de Thiols

- Cépage
- Terroir
- Contrainte hydrique
- Maturité
- **Teneur en azote du raisin**

La pulvérisation DRF 800 se fera idéalement à mi-véraison, puis un deuxième traitement suivra 7 à 10j après., sans augmenter la vigueur de la plante



Les besoins azotés de la vigne

UTILISATION

Dilution conseillée : 3l dans 100 à 150l d'eau (Concentration maximale 6%)
Ne pas appliquer au goutte à goutte

Conditionnement : bidon de 10l – palette de 600l

Débourrement	Floraison	Nouaison	Fermeture de grappe	Véraison	Maturation	Vendange

Mars	Avril/Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre
DRF 800	▲	▲	▲	▲	
	A partir du stade 4 feuilles Prévenir le millerandage	**Stade Fin floraison** Induction florale Rendement n+1	**Stade nouaison** Rendement n Allongement grappe	**Stade Mi-véraison** Azote dans les moûts Taux d'anthocyane Mise en réserve	

Utilisable en Agriculture Biologique

DUROURE.7
61 Avenue Paul LANGEVIN
07400 LE TEIL
Tel : 04.75.49.17.17

www.duroure.fr

DUROURE.12
202 Allée Henri JULIA
12850 SAINTE RADEGONDE
Tel : 05.65.42.56.24

DUROURE